



## 用藥指導-Guaifenesin

商品名：Guaphen

中文名：咳酚糖漿

成分含量：20 毫克 / c.c · 120 c.c / 瓶

作用：喀痰

### 用法與劑量

- ⊗ 6 ~ 12 歲：每 4 ~ 6 小時，每次 100 ~ 200 毫克(5 ~ 10 c.c)，每日最大極量 1200 毫克
- ⊗ 2 ~ 6 歲：每 4 ~ 6 小時，每次 50 ~ 100 毫克(2.5 ~ 5 c.c)，每日最大極量 600 毫克
- ⊗ 小於 2 歲：每 4 ~ 6 小時，每次 15 ~ 50 毫克，每日最大極量 300 毫克，同時請洽醫師診治

### 醫師/藥師指示服藥方式

每天	早餐	中餐	晚餐	睡前	特別指示
用量					

### 藥品存放方式

- ⊗ 應放於密閉容器內，室溫下(15 ~ 30 °C)，避光貯存。
- ⊗ 注意避免放在孩童容易取得的地方。
- ⊗ 服用前請先振盪均勻。

### 如果有下列任何不尋常症狀時，應儘快告知醫師/藥師：

蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨噁心、嘔吐、思睡、暈眩、胃痛等。

3 February 2017



eDucating the community by  
Sharing the expertise of the Medical Faculty

continued

### 注意事項

若您對此藥有任何疑慮，請聯絡醫師或藥師。

- Ⓢ 如果孩子忘記（錯過）一次用藥，一旦想起請儘早讓小孩服用錯過的藥物。
- Ⓢ 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
- Ⓢ 含阿斯巴甜，苯酮尿症病人（Phenylketonurics）不宜使用。
- Ⓢ 不得與酒精飲料合併服用。
- Ⓢ 看診時請隨身攜帶一份藥物的清單（處方藥、健康食品、維他命製劑、非處方藥）給醫師。
- Ⓢ 嚴格遵照醫師指示讓孩子按時定量服藥，在未徵詢醫師同意前，請勿擅自決定開始、停止服用任何藥物或變更藥物劑量。

### 兒童用藥紀錄表

時間點	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
早上							
中午							
晚上							
睡前							

本單張無法詳載完整藥品資訊，若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。

106.01 HE-CP004

中國醫藥大學兒童醫院

聯絡電話 (04) 22052121 分機 3154 / 5126

若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡