

用藥指導- Procaterol

商品名：Exdila liquid

中文名：喘解液


成分含量：5 毫微克/c.c · 60 c.c/瓶

作用：支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。

用法與劑量

6 歲以上孩童：睡前或一天兩次，每次 25 毫微克(5 c.c)



6 歲以下孩童：一天 2 ~ 3 次，每次 1.25 毫微克(0.25. c.c)/公斤

-  3 ~ 6 歲 - 每次 4 ~ 5 c.c
-  1 ~ 3 歲 - 每次 3 ~ 4 c.c
-  未滿 1 歲 - 每次 2 ~ 3 c.c

醫師/藥師指示服藥方式

每天	早餐	中餐	晚餐	睡前	特別指示
用量					

藥品存放方式


-  存放於密閉容器內，室溫下(15 ~ 30 °C)、乾燥處，避光貯存。
-  注意避免放在孩童容易取得的地方。

如果有下列任何不尋常症狀時，應儘快告知醫師/藥師：

蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨心悸、顏面潮紅、耳鳴、頭痛、胃部不適、口渴、倦怠等。

注意事項

若您對此藥有任何疑慮，請聯絡醫師或藥師。

-  如果孩子忘記 (錯過) 一次用藥，一旦想起請儘早讓小孩服

continued

3 February 2017



eDucating the community by
 sharing the expertise of the Medical Faculty

錯過的藥物。

- Ⓢ 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
- Ⓢ 避免同時服用 2 劑或額外劑量。
- Ⓢ 請勿將藥分給其他小孩吃。
- Ⓢ 看診時請隨身攜帶一份藥物的清單（處方藥、健康食品、維他命製劑、非處方藥）給醫師。
- Ⓢ 嚴格遵照醫師指示讓孩子按時定量服藥，在未徵詢醫師同意前，請勿擅自決定開始、停止服用任何藥物或變更藥物劑量。

兒童用藥紀錄表

時間點	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
早上							
中午							
晚上							
睡前							

本單張無法詳載完整藥品資訊，若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。

106.01 HE-CP007

中國醫藥大學兒童醫院

聯絡電話 (04) 22052121 分機 3154 / 5126

若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡